



Colza

Charançon des siliques

Peu d'insectes sont capturés. Les conditions pluvieuses ne sont pas favorables à leur développement.

Surveiller attentivement les bordures de parcelles. N'intervenir que si une plante sur deux est porteuse de charançons.

Mélange pyréthrinoïdes - fongicides déconseillé

Le mélange ne se justifie que très rarement. La date d'intervention contre le charançon des siliques est souvent plus tardive que le traitement fongicide. De plus, la rémanence du produit à cette date est très courte, pouvant nécessiter un deuxième passage en cas d'infestation ultérieure. Rappelons enfin que le mélange peut être agressif pour les abeilles nécessaires à la pollinisation.

Céréales

Les orges commencent à épier, les dernières feuilles des blés sortent ou devraient sortir en fin de semaine.

Orges

Avec les pluies de la semaine précédente et les pluies des prochains jours, la rhynchosporiose et l'helminthosporiose vont se développer.

Le traitement visant ces deux maladies a dû être exécuté la semaine dernière. S'il n'a pas été fait, il devient TRES urgent. Ce traitement n'est pas à renouveler si, toutefois, vous avez utilisé un produit efficace à DOSE PLEINE.

Raccourcisseur : Les produits à base d'éthéphon ne doivent plus être appliqués après l'apparition des barbes. Certains mélanges avec fongicide sont à pros-

crire. Se renseigner auprès de vos fournisseurs.

Blés

La septoriose est toujours sur la F4, voire F5. Les pluies de cette semaine et l'élévation des températures vont permettre un redémarrage de la maladie.

Spécial PRESEPT

Sur l'ensemble des stations météorologiques, le risque est toujours nul. Des hypothèses faites avec de la pluie chaque jour jusqu'à jeudi montre une nette aggravation de ce risque qui devient moyen à élevé en fin de semaine sur toutes les régions centre et est de la Lorraine. Le risque reste le plus faible dans les secteurs meusiens (plateau du Barrois et ouest Meuse) et Pays-Haut. Dans ces conditions, on peut envisager le traitement visant la septoriose en début de semaine prochaine dans tous les secteurs de Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges. En Meuse et Pays-Haut, il peut être retardé de quelques jours. Dans toutes les circonstances, utiliser un bon produit anti-septoriose (triazole seule ou associée à un produit de contact : manèbe ou chlorothalonil) à PLEINE DOSE afin d'éviter un 2ème passage à l'épiaison.

Orges de printemps

Les conditions sont maintenant favorables au désherbage de post-levée si celui-ci n'a pas encore été fait.

Maïs

Surveiller les limaces jusqu'à la sortie des premières feuilles.



Orges d'hiver et colza : Traitement fongicide urgent.

Blé : Intervenir la semaine prochaine.

Pluviométrie du 24.4 au 5.5

Poste	Hauteur de pluie en mm
Albestroff	40,5
Ancerville	51,5
Arrancy	27,0
Attignéville	78,5
Laquenexy	34,5
Laronxe	27,5
Lucey	68,5
Mélny	50,5
Mirecourt	28,0
Port-sur-Seille	50,5
Chateau-Salins	42,5
Coyviller	45,0
Kirsch-les-Luttange	37,0
Doncourt-les-Conflans	28,5

4° Jo
50614



SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

